

Cependant, à moyen ou long terme, les **effets indésirables** graves de certains médicaments doit amener à envisager une **ImmunoThérapie Spécifique d'allergènes (IS)** ou désensibilisation (voir aussi la brochure « L'immunoThérapie spécifique »).

Cette immunoThérapie spécifique (IS), basée sur les résultats des tests allergologiques conduits sur votre chien, consiste en l'injection répétée d'un **"vaccin anti-allergènes"** à doses croissantes pendant plusieurs semaines.

La majorité des chiens ont un confort de vie amélioré : 70 % des patients voient leur démangeaisons disparaître et leurs lésions cutanées fortement diminuer, avec un espacement des crises et des rechutes. Il faut attendre plusieurs mois pour juger de l'efficacité de ce traitement.


Ce dernier doit être poursuivi pendant toute la vie de l'animal, si une amélioration est observée durant la première année de traitement. Dans de rares cas, des effets indésirables transitoires (aggravation des démangeaisons par exemple) sont observés et s'estompent lors de l'ajustement des doses par votre vétérinaire.

Il faut garder à l'esprit qu'une guérison n'est pas à attendre dans le cas des maladies allergiques; ce sont des maladies, parfois à transmission héréditaire, présentes à vie chez l'animal. Identifier les allergènes responsables des symptômes pour conforter le diagnostic clinique, puis choisir un programme d'éviction et une désensibilisation: c'est à ce prix que vous améliorerez **durablement avec votre vétérinaire la qualité de vie de votre chien.**



Les symptômes

L'âge moyen d'apparition des symptômes varie de 6 mois à 3 ans sauf pour l'allergie alimentaire pouvant survenir chez des sujets très jeunes ou très vieux. Toutes les races de chiens sont touchées par les maladies allergiques. Cependant, il existe une prédisposition raciale et /ou familiale avec un caractère héréditaire avéré pour de nombreuses d'entre elles comme le Westie (WHWT), le Boxer, les Labrador et Golden Retrievers, le Berger allemand, /..



Le premier symptôme visible est une importante démangeaison. Les lésions cutanées primaires (rougeur, papule, plaque, pustule,..) puis secondaires (croûtes, dépilation,..) résultent du grattage et sont souvent accompagnées d'une surinfection bactérienne.

Ces lésions sont localisées préférentiellement au niveau de la face et des membres (entre les doigts notamment), voire au niveau des oreilles.



Dans le cas de la dermatite par allergie aux piqûres de puces (DAPP), les démangeaisons débutent le plus souvent à la base de la queue puis s'étendent sur le dos. Chez un chien atteint d'allergie alimentaire coexistent souvent des signes cutanés et digestifs (vomissement, diarrhée).



Service

Sur notre site internet, vous pouvez lire et télécharger cette brochure ainsi que d'autres informations sous la rubrique "Service / brochures pour propriétaires "

Tampon de la clinique vétérinaire

www. **LABOKLIN**.com
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Ⓓ 97688 Bad Kissingen • Steubenstraße 4
Tel. +49-971/7 20 20 • Fax +49-971/6 85 46
e-mail: info@laboklin.de • www.laboklin.com

Ⓒ 4058 Basel • Riehenring 173
Tel. +41-61/319 60 60 • Fax: +41-61/319 60 65
e-mail: labor.basel@laboklin.ch • www.laboklin.ch

Ⓐ 4040 Linz • Rosenstraße 1
Tel. +43-732/71 72-42 • Fax: +43-732/71 7322
e-mail: labor.linz@laboklin.at • www.laboklin.at

Ce que vous devez savoir sur... les **ALLERGIES** chez le **CHIEN**





Une **allergie** ou **hypersensibilité** est une maladie avec des effets très variés chez le chien. Il s'agit d'une réaction exacerbée du système immunitaire dirigée contre des antigènes étrangers à l'organisme, les **allergènes**, et qui se présente sous de multiples facettes, toutefois non contagieuse pour l'homme.

Les **principaux symptômes** chez le chien sont des **démangeaisons** et secondairement, différentes **lésions cutanées**. Les manifestations cliniques peuvent être très variables ; pour certains chiens, il s'agit d'une maladie plutôt bénigne, pour d'autres, l'intensité des symptômes peut conduire à une altération de la qualité de vie du chien.

Les maladies allergiques et les allergènes responsables sont légion à l'instar des possibilités de traitement. C'est pourquoi il est indispensable d'obtenir un **diagnostic** de qualité, c'est-à-dire identifier les allergènes incriminés qui sont surtout, chez le chien, les puces, les acariens de poussière de maison, les pollens et les aliments.



Les premiers signes d'une allergie

1). Les **circonstances d'apparition** sont les premiers indices importants. Par exemple, si les symptômes sont prédominants au printemps et en été, les pollens sont souvent incriminés. Le même caractère saisonnier est retrouvé dans l'allergie aux piqûres de puces, selon leur présence sur le chien, voire sur un autre animal proche hébergeant des puces (penser au chat !).



2). Une **allergie aux acariens de poussière de maison** peut par contre sévir toute l'année avec aggravation possible des symptômes ..si le chien dort dans la chambre à coucher.



3). Dans le cas d'une **allergie alimentaire**, la relation directe avec l'aliment en cause est parfois observée, cependant, le délai d'apparition des symptômes complique le diagnostic (l'aliment est souvent consommé depuis plusieurs mois). Le changement d'alimentation (marque d'aliment et /ou goût différents) n'apporte en général pas d'amélioration.



Une analyse détaillée du **mode de vie du chien** est le premier pas vers le diagnostic d'une allergie. Votre vétérinaire exclura par des examens appropriés les autres maladies responsables de démangeaisons et de lésions cutanées.



Il sera orienté dans son choix par la nature de ces lésions ; ainsi votre vétérinaire pourra (faire) examiner des poils ou un raclage de peau pour rechercher des bactéries, champignons ou parasites ou encore pratiquer des biopsies de peau en vue d'un examen dans un laboratoire spécialisé. Des analyses sanguines peuvent apporter un éclairage dans certaines maladies. Après avoir exclu les autres affections courantes, votre vétérinaire pourra confirmer son diagnostic de maladie allergique par des examens approfondis.

Pour l'essentiel, les techniques d'exploration sont de deux types :


Test cutanés :

En injectant une batterie d'extraits allergéniques sous la peau, le vétérinaire peut constater dans les 10 à 20 minutes suivantes une réaction .



Test sanguins:

Dans certaines allergies sont produits des anticorps en réponse à une sensibilisation à un allergène donné. Ces anticorps peuvent être mis en évidence dans le sang et pour ce faire, votre vétérinaire doit prélever du sang sur votre animal qu'il confiera au laboratoire de son choix.



Aucun de ces tests allergologiques n'est une panacée en soi. Votre vétérinaire choisira le(s) examen(s) le(s) plus approprié(s) pour votre animal à la lumière de son examen clinique qui demeure la phase essentielle de sa démarche diagnostique.

Cas particulier

Les allergies alimentaires, qui font partie des **intolérances** alimentaires, représentent un cas particulier. Elles sont de diagnostic difficile car la réaction immunitaire du tube digestif aux aliments est très variable. Un diagnostic fiable est seulement possible après la mise en place d'un "**régime d'éviction**" nécessitant la pleine coopération du propriétaire. Si le principe paraît simple, l'application pratique est parfois difficile, notamment dans un foyer où cohabitent des personnes âgées, des enfants ou d'autres animaux.

Tant pour le diagnostic que pour le traitement, ce régime doit être strict et aucun écart n'est permis. Il repose sur l'administration pendant 6 à 8 semaines d'une ration contenant un ou plusieurs aliments que le chien n'a jamais ingéré auparavant. Selon les conseils de votre vétérinaire, ce pourra être, soit une préparation ménagère, soit un aliment industriel "hypoallergénique".

La disparition des démangeaisons et des symptômes digestifs confirme l'efficacité du régime. Dans ce cas, le diagnostic peut être confirmé par une phase de provocation en réintroduisant l'ancien aliment afin d'observer une éventuelle réapparition des symptômes.

La mise en évidence sur un échantillon sanguin des anticorps dirigés contre les allergènes alimentaires sera utile pour choisir avec votre vétérinaire les constituants de la nouvelle ration "hypoallergénique" de votre chien. Pour toutes les autres formes d'intolérance alimentaire sans intervention du système immunitaire, ces examens sanguins sont de peu d'intérêt; seule la mise en place d'une régime "hypoallergénique" amènera au diagnostic.

Les allergènes sont connus - que faire maintenant ?

L'**éviction des allergènes** est le traitement de choix. C'est assez simple pour une allergie aux piqûres de puces ou à certains aliments, beaucoup plus difficile pour les allergies aux pollens ou aux acariens de poussière de maison, l'exposition ne pouvant pas toujours être contrôlée. Quant aux allergies à caractère saisonnier n'affectant les animaux que pendant une courte période, une prise en charge médicamenteuse est souvent suffisante.

